



11.6.2015

Muutoksia D-vitamiinimääritysten viiterajoihin

Tutkimus [S -D-25 \(1220\)](#)

[S -D-Vitamiini-25-OH](#)

Aihe Viiteraja muuttuu 22.6.2015. Tutkimus pysyy muutoin ennallaan.

Tausta Seerumin 25-hydroksi-D-vitamiinille (kalsidiolille) otetaan käyttöön päivitetyn Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen mukaiset viiterajat.
"Osteoporoosin Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Endokrinologiyhdistyksen ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Osteoporoosi. Päivitetty Käypä hoito-suositus 24.4.2014. www.kaypahoito.fi."

Viitearvo Tavoite
Kaikki yli 50 nmol/l

Tulkinta Vitamiinitason tulkinta:
Alle 25 nmol/l vakava puutos
Alle 50 nmol/l puutos
50 - 75 nmol/l yleensä riittäväksi katsottu pitoisuus
75 - 120 nmol/l tavoitepitoisuus osteoporoosipotilaalla.
Yli 375 nmol/l toksinen pitoisuus

Tutkimus [S -D-1,25 \(3163\)](#)

[S -D-Vitamiini-1,25-OH](#)

Aihe Viiteraja muuttuu 22.6.2015 tutkimusmenetelmämuutoksesta johtuen

Tausta Tekninen muutos seerumin 1,25-hydroksi-D-vitamiinin (kalsitriolin) määritysmenetelmässä aiheuttaa viitearvomuutoksen.

Viitearvo Kaikki 52 - 267 pmol/l

Kari Punnonen
johtava ylilääkäri
toimitusjohtaja

Jarkko Romppanen
osastonylilääkäri

Jakelu ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
OA:KERANA
Internet, intranet