

17.3.2017

Fondaparinuuksi- ja Danaparoidipitoisuuden arviointi P –antiFXa –tutkimuksen (P - AntiFXa, 3828) avulla 17.3.2017 alkaen**Tutkimus**

P -AntifaktoriX-aktiivisuus (P -AntiFXa, 3828)

Aihe

Fondaparinuuksi- ja danaparoidipitoisuuden arviointi ISLABissa analysoidun P – antiFXa –tutkimustuloksen (P - AntiFXa, 3828) avulla 17.3.2017 alkaen.

Tulkinta***Fondaparinuuksihoito (Arixtra):***

Mikäli potilasta hoidetaan fondaparinuuksilla, voidaan P -AntiFXa tulosta käyttää fondaparinuuksipitoisuuden arviointiin siten, että hoitoyksikkö kertoo laboratorion potilaskertomusjärjestelmään ilmoittaman tuloksen kertoimella 0,60 (fondaparinuuksitulokset on yksikköä IU/ml).

Danaparoidihoito (Orgaran):

Mikäli potilasta hoidetaan danaparoidilla, voidaan P -AntiFXa tulosta käyttää danaparoidipitoisuuden arviointiin siten, että hoitoyksikkö kertoo laboratorion potilaskertomusjärjestelmään ilmoittaman tuloksen kertoimella 0,70 (danaparoiditulokset on yksikköä IU/ml).

Menetelmä

Kromogeeninen funktionaalinen määrittäminen.

Kari Punnonen
toimitusjohtajaPentti Mäntymaa
osastonylilääkäriMikko Mättö
sairaalakemisti**Jakelu**ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
KYSin osastot ja poliklinikat
OA:HEMAUT
Internet
Intranet