



Menetelmämuutos P-INR-tutkimuksessa KYS Puijon sairaalan ja Savotalon laboratoriossa

Tutkimus P- Tromboplastiiniaika, INR-tulos, P-INR (4520)

Aihe Islabin KYS Puijon sairaalan ja Savotalon laboratorioissa otetaan 2.10.2012 alkaen käyttöön uusi tromboplastiiniajan määrittäminen, jonka seurauksena P-INR-tutkimuksen tulostaso laskee keskimäärin noin 10 % nykyisestä, mutta potilaskohtaisesti muutokset voivat olla tätä pienempiä tai suurempia.

INR-tutkimuksen menetelmämuutos tapahtuu hyytymisanalytiikan laitekannan uudistuessa vaiheittain Islabin laboratorioissa loppuvuoden 2012 aikana, joten eri laboratorioiden välillä saattaa potilaskohtaisesti olla todettavissa tulostasoeroa. Yllättävät INR-tason muutokset on syytä kontrolloida uudella näytteellä, mikäli potilas on hakeutunut eri näytteenotto pisteeseen kuin missä hänen aikaisemmat INR-näytteensä on otettu. Laboratoriokohtaisesti INR-menetelmän muutoksesta tiedotetaan aina paikallisesti omalla tiedotteella. Menetelmämuutos on saatettu loppuun kaikissa Islabin laboratorioissa helmikuuhun 2013 mennessä.

Näyte 2.7 ml sitraattiputki

Tulkinta Menetelmämuutoksella ei ole vaikutusta Marevan-lääkityksen INR-hoitoalueeseen.

Kari Punnonen
toimitusjohtaja

Pentti Mäntymaa
apulaisylilääkäri

Jakelu ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Kuopion aluelaboratorio: KYSin osastot ja poliklinikat
PSSHP terveyskeskuksen ja sairaalat
OA:HEMAUT
Internet, intranet