



23.6.2020

**Ulostenäytteen ottaminen Helicobacter pylori –antigeenin osoitusta varten.  
Pyyntö: F-HepyAg (3952).**

Testi soveltuu sekä Helicobacter pylori -infektion osoittamiseen että häättöhoidon seurantaan.

**Huomioitavaa**

Luotettavan testituloksen varmistamiseksi tulisi ennen testin suorittamista huomioida seuraavat asiat:

- Mikäli olette saanut helikobakteerin häättöhoidon, voidaan hoidon onnistuminen arvioida vasta 4-5 viikon kuluttua hoidon loppumisesta otetusta ulostenäytteestä
- Ennen ulostenäytteen ottamista tulee välttää 2 viikon ajan seuraavia lääkkeitä:
  - o Antibiootit
  - o Protonipumppuinhibiitorit (lääkevalmisteiden vaikuttavana aineena lansopratsoli, omepratsoli, pantopratsoli, esomepratsoli tai rabepratsoli)

Säännöllisesti käytettävät lääkkeet kuten sydän-, verenpaine-, astma- ja epilepsialäkkeet tulee ottaa normaalisti.

**Näytteenottovälineet:**

- ulostenäytepurkki (kierrekorkillinen muoviasia)
- tarralappu nimitietoja varten

**Näytteenotto:**

Tuotetta ulostetta laitetaan näytepurkkiin (noin puoli purkillista). Näytepurkin kansi suljetaan huolellisesti. Tarralappuun kirjoitetaan nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä. Tarra liimataan purkin kylkeen. Pakkaa purkki pieneen muovipussiin. Jos mukana on paperilähete, se jätetään pussin ulkopuolelle.

**Näytteen säilytys:**

Näyte ja mahdollinen paperilähete toimitetaan mahdollisimman pian, tai viimeistään seuraavana aamuna, laboratorioon. Kuljetusta odottava näyte säilytetään jääkaappilämpötilassa. Näytepurkin voi toimittaa laboratorioon huoneenlämmössä.

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkäriinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.