

Tumavasta-aineiden esiintyvyys (%) eri sairauksissa:

	SLE	MCTD	Syst.skleroosi	CREST	Sjögren	DM/PM	Terveet verrokkit
ANA (≥1:160)	90-95 %	95 %	70-90 %	70-90 %	70-90 %	40-60 %	10-15%
Spesifiset vasta-aineet							
Natiivi DNA	50-90 %*	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %
Sm	10-30 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %
RNP	20-30 %	> 90 %	5-15 %	10 %	< 5 %	15 %	< 5 %
SS-B (La)	20 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	60 %	< 5 %	< 5 %
SS-A (Ro)	25-40 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	70-80 %	10-20 %	< 5 %
Sci-70	< 5 %	< 5 %	30-50 %	10 %	< 5 %	<5 %	< 5 %
Jo-1	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %	30 -40 %	< 5 %
Sentromeeri	< 5 %	< 5 %	30 %	70-85 %	< 5 %	< 5 %	< 5 %

SLE, systeeminen lupus erytematosus; MCTD, sekamuotoinen sidekudostauti; DM/PM, dermatomyosiitti/polymyosiitti

* Riippuen taudin aktiivisuudesta

Viitteet:

- 1) Op De Beeck K Autoimm Rev 2011
- 2) Perez D Autoimm Rev 2018
- 3) Claessens J Autoimm Rev 2018
- 4) Bossuyt X Nat Rev Rheumatol 2020