

12.6.2023

Näytteenotto *Helicobacter pylori* –antigeenin osoitusta varten (F-HepyAg, 3952)

Testi soveltuu sekä *Helicobacter pylori* -infektion osoittamiseen että häättöhoidon seurantaan.

Huomioitavaa

Luotettavan testituloksen varmistamiseksi tulisi ennen testin suorittamista huomioida seuraavat asiat:

- Mikäli olet saanut helikobakteerin häättöhoidon, voidaan hoidon onnistuminen arvioida vasta 4-5 viikon kuluttua hoidon loppumisesta otetusta ulostenäytteestä.
- Ennen ulostenäytteen ottamista tulee välttää 2 viikon ajan seuraavia lääkkeitä:
 - Antibiootit
 - Protonipumppuinhiihtorit (lääkevalmisteen vaikuttavana aineena lansopratsoli, omepratsoli, pantopratsoli, esomepratsoli tai rabepratsoli)
 - Vismuttivalmisteet
- Säännöllisesti käytettävät lääkkeet kuten sydän-, verenpaine-, astma- ja epilepsialäkkeet tulee ottaa normaalisti.

Näytteenottovälineet

- Ulostenäytepurkki
- Tarra henkilötietoja varten

Näytteenotto

- Tyhjä virtsarakko ennen ulostamista (virtsa ei tulisi päätyä näytteeseen).
- Ulosta wc-paperille tai puhtaaseen, kuivaan astiaan, esim. kertakäyttöastia tai puhtaalla muovipussilla (esim. pakastepussi) suojattu potta tai muu sopiva astia.
- Laita tuoretta ulostetta näytepurkkiin (noin puoli purkillista).
- Sulje näytepurkin kansi huolellisesti kiertämällä ja varmista, ettei astia vuoda.
- Kirjoita tarraan nimesi, henkilötunnuksesi ja näytteenottoaika. Liimaa tarra näytepurkin kylkeen.
- Laita näytepurkki muovipussiin. Jos mukana on paperilähete, jätä se pussin ulkopuolelle.

Näytteen säilytys

Säilytä näyte kylmässä ja toimita se laboratorioon mahdollisimman pian. Näytteen voi kuljettaa laboratorioon huoneenlämmössä.

Ilmoittakaa näytteenottajalle, jos ette ole voineet noudattaa tätä potilasohjetta tai jos olette saaneet tästä poikkeavia erityisohjeita.

Tutkimuksiin tai tuloksiin liittyviin kysymyksiin vastaa oma lääkärinne tai hoitajanne. Laboratorio vastaa näytteenottoon liittyviin kysymyksiin.