


Hengitystienäytteenotto

Näytteet ottaa hoitoyksikön henkilökunta hyvinvointialueen ohjeistuksen mukaisesti suojautuneena.

Vakavaoireiselta potilaalta suositellaan otettavaksi sekä ylähengitystie- (nenänielu/nielu) että alahengitystienäyte, molemmille näytteille tehdään oma tutkimuspyyntö.

Tikkunäyte nenänielusta

Näytteenottotikku (nylonnukkatikku, ohuempi) työnnetään alaviistoon nenänpohjaa pitkin sieraimen noin 12–15 cm syvyyteen (syvyys mitataan etukäteen, sierainkorrannipukka; aikuisilla aina yli 10 cm, alle 2-vuotiailla lapsilla 6–7 cm) ja kiertoliikkeellä hangataan limakalvoja siten, että tikkuun tarttuu limakalvolta irronneita soluja. Tikku katkaistaan viruskuljetusputkeen (COPAN UTM-RT).



Tikkunäyte nielusta

Vuotoherkiltä potilailta tai tilanteen niin vaatiessa esim. nenänielutikun saatavuusongelman vuoksi, ylähengitystienäyte voidaan ottaa nielusta (nylonnukkatikku, paksumpi). Näyte otetaan nielukaarista pyörittävällä hankausliikkeellä siten, että näytteenottotikkuun tarttuu riittävästi soluja. Tikku katkaistaan viruskuljetusputkeen (COPAN UTM-RT).

Nenänieluimunäytteen ottaminen

Tarvittaessa voidaan sieraimia kostuttaa noin 2 ml keittosuolaa. Imuun kytketyn limanäyteputken letku työnnetään nenän kautta nenänieluun ja näyteputkeen ime-tään limaa molemmista sieraimista.

Alahengitystienäyte

Yskös tai BAL sellaisenaan steriilissä tiiviissä näyteastiassa